

平成28年度特別栽培米栽培基準（コシヒカリ・頸北地域特19）（実績）

（頸北地区エコ米研究会・コシヒカリ）

（JA名：JAえちご上越）

項目	実施内容
1. 品 種	コシヒカリBL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 えちご上越ソイル元気（40kg/10a）、（えちご上越ソイルスター（40kg/10a））又は堆肥（500kg/10a）の施用、 スーパーシリカプレミアム（ケイ酸肥料）
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒又はエコホープDJ又はタフブロック 育苗消毒 カスミン粒剤／液剤、フェルテラ箱粒剤 健苗育苗
4. 施 肥	育苗 ホーネズ培土1号 70.0 kg／10 a（成分 N・P・K 各0.0325） 又は川西培土 75.0 kg／10 a（成分 N0.039・P0.058・K0.048） 又は稚苗苗代配合 0.75 kg／10 a（成分 N0.03・P0.045・K0.0375） 又はすくすく肥料 1.20 kg／10 a（成分 N・P・K 各0.1200） くみあい液肥2号 0.30kg／10 a（成分 N0.0303・P0.012・K0.024） 又はべんとう肥 0.50kg／10 a（成分N0.04・P0.04・K0.04） 元肥 有機アグレット816 25kg／10 a（成分 N2.0・P0.25・K1.5） 追肥 JAチャレンジャー穂肥エコ310 20kg／10 a（成分 N2.0・P0.8・K2.0）
5. 移 植	植付本数 3～4本／株 植付株数 50～60株／坪当たり 稚苗移植 5月10日以降田植え
6. 除 草	ウィナー（1 <sup>キ</sup> 粒剤51／Lフロアブル／Lジャンボ） 5月中下旬 （移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで） 後期除草剤は使用しない。
7. 中 耕	
8. 水 管 理	6月10日～20日 溝切り、中干しの徹底による生育調整 生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより 生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・・カメムシ防除 キラップ（粉剤DL／粒剤／フロアブル） 8月上中旬1回 殺菌剤・・稲こうじ病予防 撒粉ボルドー粉剤DL 出穂20～10日前
10. 乾燥・調製	玄米最終水分調製 14.5～14.9% ふるい目 1.85mm使用 整粒歩合 85% 千粒重 21～22 g