

平成30年度特別栽培米栽培基準（コシヒカリ・頸北地域特21）実績

頸北地区エコ米研究会 コシヒカリ パル10

（JA名：JAえちご上越）

項目	実施内容
1. 品 種	コシヒカリBL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 えちご上越ソイル元気（40kg/10a）、ソイルスター又は堆肥（500kg/10a）、スーパーシリカプレミアム（ケイ酸肥料）の施用
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒 育苗消毒 フェルテラ箱粒剤 健苗育苗
4. 施 肥	育苗 ホーネズ培土1号 70.0 kg/10 a （成分 N・P・K 各0.0325） 又は川西培土 75.0 kg/10 a （成分 N0.039・P0.058・K0.048） 又は稚苗苗代配合 0.75 kg/10 a （成分 N0.03・P0.045・K0.0375） 又はすくすく肥料 1 kg/10 a（成分 N・P・K 各0.1） くみあい液肥2号 0.30kg/10 a （成分 N0.0303・P0.012・K0.024） 又はべんとう肥 0.50kg/10 a （成分N0.04・P0.04・K0.04） 元肥 有機アグレット816 25kg/10 a （成分 N2.0・P0.25・K1.5） 追肥 有機アグレット816 25kg/10 a （成分 N2.0・P0.25・K1.5）
5. 移 植	植付本数 3～4本/株 植付株数 50～60株/坪当たり 稚苗移植 5月10日以降田植え
6. 除 草	ガンガン（1 ^キ 粒剤/豆つぶ250/ジャンボ） 5月中下旬 （粒剤：移植直後～ルビエ3葉期 豆つぶ・フアブル：移植後3日～ルビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで） 後期除草剤は使用しない。
7. 中 耕	
8. 水 管 理	6月10日～20日 溝切り、中干しの徹底による生育調整 生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより 生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・カメムシ防除 キラップ（粉剤/粒剤/液剤） 8月上中旬1回 殺菌剤・稲こうじ病、墨黒穂病防除 Zボルドー粉剤DL 出穂20～10日前
10. 乾燥・調製	玄米最終水分調製 14.5～14.9% ふるい目 1.85mm使用 整粒歩合 85% 千粒重 21～22 g