

令和元年度特別栽培米栽培基準（コシヒカリ・頸北地域特１９）

(JA名：JAえちご上越)

項 目	実 施 内 容	
1．品 種	コシヒカリBL	
2．土づくり	秋すき込みの実施	
	えちご上越ソイル元気（40kg/10a）、（えちご上越ソイルスター（40kg/10a））又は堆肥（500kg/10a）の施用 スーパーシリカプレミアム（ケイ酸肥料）	
3．播種・育苗	種子消毒	温湯消毒
	育苗消毒	カシ粒剤／液剤、パディート箱粒剤
	健苗育苗	
4．施 肥	育苗	ホーネス培土1号 70.0 kg／10 a（成分 N・P・K 各0.0325）
	又は川西培土 75.0 kg／10 a（成分 N0.039・P0.058・K0.048）	
	又は稚苗苗代配合 0.75 kg／10 a（成分 N0.03・P0.045・K0.0375）	
	又はすくすく肥料 1 kg／10 a（成分 N・P・K 各0.1）	
	くみあい液肥2号 0.30kg／10 a（成分 N0.0303・P0.012・K0.024）	
	又はべんとう肥 0.50kg／10 a（成分N0.04・P0.04・K0.04）	
	元肥	有機アグレット816 25kg／10 a（成分 N2.0・P0.25・K1.5）
	追肥	越後の輝き有機50穂肥 20kg／10 a（成分 N2.4・P0.4・K1.6）
5．移 植	植付本数	3～4本／株
	植付株数	50～60株／坪当たり
	稚苗移植	5月10日以降田植え
6．除 草	シュナイデン（1 ^{キロ} 粒剤／フロアブル／ジャンボ） 5月中下旬	
	（粒剤：移植直後～刈 ^ヒ エ2.5葉期 フロアブル・ジャンボ：移植後3日～刈 ^ヒ エ2.5葉期 ただし、移植後30日まで）	
	後期除草剤は使用しない。	
7．中 耕		
8．水 管 理	6月10日～20日	
	溝切り、中干しの徹底による生育調整	
	生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより	
	生育調整の徹底をはかる。	
	早期落水をしない。	
9．病虫害防除	殺虫剤・・カメムシ防除	キラップ（粉剤DL／粒剤／フロアブル） 8月上中旬1回
	殺菌剤・・稲こうじ病、墨黒穂病	Z ^ボ ルト ^ー 粉剤DL 出穂20～10日前
10．乾燥・調製	玄米最終水分調製	14.5～14.9％
	ふるい目	1.85mm使用
	整粒歩合	85％
	千粒重	21～22 g