

分けつ旺盛で茎数多い。直ちに中干し!

1 生育概況

6/10 現在の生育 草丈：並 茎数：多い 葉数の進み：やや早い 葉色：並
 ※コシヒカリ (指標値比) (103%) (134%) (+0.6葉) (SPAD値+0.9)

- 「コシヒカリ」の生育は好天に恵まれ進んでおり、茎数は多い状況です。生育過剰による品質低下につながる恐れがあります。
- 「こしいぶき」の生育も同様に、茎数が多い状況となっています。

2 今後の管理

- すでに中干し適期となっているほ場が多く見られます。5月15日頃までに移植したほ場では、直ちに中干しを開始してください。
- 遅植えのほ場でも油断せず田植後25日までに茎数を確認し、遅れずに中干しを開始しましょう。
- 例年、生育が過剰となるほ場では、より早めに中干しを開始しましょう。
- 中干しは、田面に幅1cm程度のヒビが入るまで乾かし地耐力を確保しましょう。
- 溝切りにより水を水田全体に効率良く行き渡らせることができます。溝切りは必ず実施し、確実に排水溝につないでください。
- 「こしいぶき」で中干しを実施していないほ場は、速やかに中干しを開始してください。

田植え	中干し開始時期	管理状況
5/10	6/5	中干し実施中!
5/15	6/10	中干し開始!
5/20	6/15	速やかに茎数確認

地域	1株当たり茎数のめやす(本/株)		
	50株植え	60株植え	70株植え
平地	17	14	—
中山間地	—	14	12

3 生育調査結果 (6月10日現在)

	田植	草丈(cm)			茎数(本)			葉数(葉)			葉色(SPAD)			田植機 セット株数		
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差			
コシヒカリ	下稲塚	5/9	30	100	100	m ² 当たり 348	株当たり 19	148	110	8.3	1.3	1.1	39.3	2.3	1.2	60株
	高森	5/15	30	100	94	302	15	129	107	7.5	0.5	-0.4	39.2	2.2	0.6	60株
	長崎	5/9	35	115	96	369	23	157	108	7.3	0.3	-0.6	36.5	-0.5	-1.2	60株
	広島	5/16	29	97	97	236	14	100	101	7.3	0.3	-0.1	36.4	-0.5	-0.9	50株
	平均		31	103	97	314	18	134	107	7.6	0.6	0.0	37.9	0.9	0.0	
こしいぶき	下稲塚	5/9	30	106	110	375	20	170	108	8.4	1.4	0.8	42.5	2.5	-0.4	60株
	長崎	5/18	30	106	103	297	15	135	181	6.8	-0.2	0.5	34.9	-5.1	2.0	60株
	広島	5/13	30	107	97	314	19	143	103	8.0	1.0	0.1	43.2	3.2	0.3	50株
	平均		30	107	103	329	18	150	121	7.7	0.7	0.4	40.2	0.2	0.6	

4 北陸地方1か月予報 (新潟地方気象台 6月4日発表)

- 向こう1か月の天候見通しは、期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

問い合わせ先 上越農業普及指導センター作物担当 (電話025-526-9406)